TÁJÉKOZTATÓ BCG VÉDŐOLTÁS ESEDÉKESSÉGÉRŐL ÉS FELHÍVÁS AZ OLTÓHELYEN TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSRE (....sz.)

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 5.§ és 15.§ alapján.)

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Értesítem, hogy ..... nevű

gyermeke, születési helye: .....

születési ideje: .....

TAJ száma:.....

tartózkodási címe: .....

BCG (Bacillus Calmette-Guérin) védőoltásra kötelezett.

Kérem, szíveskedjék a védőoltás beadásának céljából gyermekével megjelenni az őt ellátó házi gyermekorvos/házi orvos soron következő tanácsadásán/rendelésén.

A tanácsadás helyszíne:.....

A tanácsadás időpontja:.....

Szíveskedjék magával hozni a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.

Ha bármilyen okból a fenti címen és időpontban nem tud megjelenni, akkor szíveskedjék értesíteni, illetve ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni.

Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül - többszöri értesítés ellenére - elmarad, akkor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi/fővárosi kerületi intézete a védőoltás beadását határozattal rendeli el.

A védőoltással kapcsolatos információk, szükséges tudnivalók a túloldalon olvashatók.
Fontos, hogy még a védőoltás beadása előtt tájékozott legyen.

Tuberculosis (gümőkór) ellen Magyarországon minden egészséges újszülöttet még a szülészeti intézményben, de legkésőbb 6 héten belül BCG vakcinával védőoltásban részesítenek. A vakcinát hazánkban több évtizede alkalmazzák a gümőkór megelőzésére. A gyermekkori megbetegedések előfordulásának kiemelkedően kedvező alakulása elsősorban az újszülöttek igen magas arányban végrehajtott BCG oltottságának köszönhető.
Az oltás helyi reakciója nyomán 2-4 hét múlva 10 mm-t általában meg nem haladó átmérőjű, vörös, kékesvörös csomó képződik az injekció helyén, amely maximális nagyságát 4-6 héttel az oltás után éri el. A csomó közepe gyakran beolvad és kiürül, majd pörkösödik vagy felszínes gennyező fekély képződik, amely lassan feltisztul és legkésőbb 4 hónappal az oltás után kis fehér heggel gyógyul. Ezzel egy időben a hónalji nyirokcsomók is megduzzadhatnak.
Amennyiben az oltási fekély 10 mm-nél nagyobb vagy a hónalji nyirokcsomóban tályog képződik arról haladéktalanul értesíteni kell a gyermek háziorvosát.
A szülést követően 6 héten belül BCG oltásban részesített csecsemőket 6 hónapos koruk betöltésekor ellenőrizni kell. Azoknál a csecsemőknél, akiknél a BCG oltás helyén beszűrődés, vagy heg nem látható, a BCG oltást meg kell ismételni.
Azokat a csecsemőket, akik az ismételt BCG oltás után is heg negatívak maradnak, nem kell további BCG oltásban részesíteni.

A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke oltását végző orvost!

Dátum: .....

.....

PH. az Ön védőnője

Védőnői szolgálat neve: .....

címe: .....

telefonszáma:.....

✂ ✂

Aláírásommal igazolom, hogy a BCG védőoltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen a megjelenésről szóló értesítést (.....sz.) megkaptam és átvettem.

Dátum: .....

.....
aláírás