

**TÁJÉKOZTATÓ MMR VÉDŐOLTÁS ESEDEKESÉGÉRŐL ÉS FELHÍVÁS AZ OLTÓHELYEN TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSRE (.....SZ.)**

(A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM 5.§ és 15.§ alapján.)

**Tisztelt Szülő/Gondviselő!**

Értesítem, hogy .....

nevű gyermeke, születési helye:.....

születési ideje:.....

TAJ száma:.....

Tartózkodási címe: .....

**MMR (morbilli-mumpsz-rubeola elleni) védőoltásra kötelezett.****Kérem, szíveskedjék a védőoltás beadásának céljából gyermekével megjelenni az őt ellátó házi gyermekorvos/házi orvos soron következő tanácsadásán/rendelésén.**

A tanácsadás helyszíne: .....

.....

A tanácsadás időpontja: .....

*Szíveskedjék magával hozni a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet.***Ha bármilyen okból a fenti címen és időpontban nem tud megjelenni, akkor szíveskedjék értesíteni, illetve ha gyermeke a védőoltását már megkapta, vagy a védőoltás beadása alól végleges mentességet kapott, akkor ezt igazolni.***Tájékoztatom arról is, hogy amennyiben gyermeke kötelező védőoltása, megalapozott orvosi indok nélkül - többszöri értesítés ellenére - elmarad, akkor az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi/fővárosi kerületi intézete a védőoltás beadását határozattal rendeli el.***A védőoltással kapcsolatos információk, szükséges tudnivalók a túldoldalon olvashatók. Fontos, hogy még a védőoltás beadása előtt tájékozott legyen.**A vírusok okozta, cseppfertőzéssel terjedő fertőző gyermekbetegségek közül - a **kanyaró, a mumpsz, a rózsahimlő** – megbetegedések megelőzése céljából Magyarországon minden egészséges 15 hónapos gyermek MMR védőoltásra kötelezett.A **kanyaró** (morbilli, **M**) 9-10 napos lappangási idő után lázzal, köhögéssel, huruttal és kötőhártya-gyulladással kezdődik, majd pár nap múlva a fül mögött kezdődő és az egész testen végigvonuló kiütések lépnek fel. Súlyos betegség, mely könnyen átvihető egyik emberről a másikra.A **járványos fültömírgy gyulladás** (mumpsz, **M**) 2-3 hét lappangási idő után lázzal és az egyik, majd a másik oldali nyálmirigy duzzanatával jár. Fiúknál a betegség szövődményeként jelentkező heregyulladás súlyos következményekkel járhat.A **rózsahimlő** (rubeola, **R**) lappangási ideje 2-3 hét. Gyermekeknél enyhe formában zajlik, láz apró kiütések, tarkótáji nyirokcsomó duzzanat formájában. A terhesség első harmadában átvészelt fertőzés következménye lehet az ún. **veleszületett rubeola** (fejlődési rendellenességekben jelentkezik).

A több évtizede alkalmazott oltási stratégiának köszönhetően az utóbbi években hazai eredetű kanyaró megbetegedés nem fordult elő, a rózsahimlő és mumpsz megbetegedések évi száma napjainkra 50-100 alá csökkent.

Az oltóanyag, élő gyengített kanyaró, rózsahimlő és mumpsz vírusokat tartalmaz. A természetes fertőzéshez hasonló módon hat a védekező-rendszerre. Általában az 5-12. nap között ún. oltási betegség léphet fel lázzal, kiütéssel, esetleg nyálmirigy duzzanattal. A tünetek sokkal enyhébbek, mint a természetes betegségnél észleltek és 1-2 napnál nem tartanak tovább. **A lázas állapot gondos megfigyelést és folyamatos lázcsillapítást igényel.****A védőoltást követő reakciókról tájékoztassa a gyermeke oltását végző orvost!**

Dátum: .....

.....  
PH. az Ön védőnöje

Védőnöi szolgálat neve: .....

címe: .....

telefonszáma: .....

✂ ✂

Aláírással igazolom, hogy az MMR védőoltásról szóló tájékoztatást, valamint az oltóhelyen a megjelenésről szóló értesítést (.....sz.) megkaptam és átvettem.

Dátum: .....

.....

aláírás